

Pflichttext:

Cetirizin Aristo® Allergiesaft 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen/**Cetirizin Aristo**® bei Allergien, 10 mg Filmtabletten (**Ap**) Wirkstoff: Cetirizindihydrochlorid **Zus.:** 1 ml Lösung z. Einn. enth. 1 mg Cetirizindihydrochlorid. Sonst. Bestandt.: Glycerol, Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.), Propylenglycol, Saccharin-Natrium, Kirscharoma o. w. A., Natriumacetat-Trihydrat, Sorbitol-Lösung 70% (nicht kristallisierend) (Ph. Eur.), Essigsäure 99%, Gereinigtes Wasser; 1 Filmtbl. enth.: 10mg Cetirizin-2HCl. Sonst. Bestandt.: Lactose-Monohydrat, Macrogol 4000, mikrokrist. Cellulose, Hypromellose, hochdisp. Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Farbstoff: Titandioxid (E 171). **Anw.:** **Allergiesaft:** Kdr. ab 2 J. und Erwachs.: zur Linderung von nasalen und okularen Symptomen bei saisonaler und perennialer allergischer Rhinitis; zur Linderung von Symptomen bei chronischer idiopathischer Urtikaria; **Filmtbl.:** Kdr. ab 6 J. und Erwachs.: Symptom. Behandlung allergischer Erkrankungen wie chronischer Nesselsucht (Urtikaria), chronischem allergischen Schnupfen, Juckreiz bei chronischer Nesselsucht (Urtikaria) und bei atopischer Dermatitis (Neurodermitis), Heuschnupfen mit Beschwerden wie z. B. Niesen, Nasenlaufen, Nasenjucken, Nasenverstopfung, Rötung bzw. Jucken der Augen sowie Tränenfluss, adjuvantiv bei asthmoiden Zuständen allergischer Herkunft. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit geg. d. Wirkstoff, Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.), od. ei. d. sonstig. Bestand, Hydroxyzin od. and. Piperazin-Derivaten; schwere Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance unter 10 ml/ min.); Stillzeit. **Schwangerschaft:** Anwendung vermeiden/Vorsicht geboten. **Nebenwirk.:** Häufig: Diarrhöe. Gelegentlich: Agitiertheit; Parästhesie; Pruritus, Ausschlag; Asthenie, Unwohlsein. Selten: Überempfindlichkeit; Aggression, Verwirrtheit, Depression, Halluzinationen, Schlaflosigkeit; Konvulsionen; Tachykardie; auffällige Leberfunktion (erhöhte Werte für Transaminasen, alkalische Phosphatase, γ -GT und Bilirubin); Urtikaria; Ödeme; Gewichtszunahme. Sehr selten: Thrombozytopenie; anaphylaktischer Schock; Tics; Dysgeusie, Synkope, Tremor, Dystonie, Dyskinesie; Akkommodationsstörungen, verschwommenes Sehen, Okulogyration; Qioncke-Ödem/angioneurotisches Ödem, fixes Arzneimittelexanthem; Dysurie, Enuresis. Nicht bekannt: gesteigerter Appetit; Suizidgedanken; Amnesie, Beeinträchtigung des Gedächtnisses; Vertigo; Harnverhalt. Nach Absetzen von Cetirizin wurde von Pruritus (intensiver Juckreiz) und/oder Urtikaria berichtet. **Allergiesaft:** Enthält Sorbitol und Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.). Packungsbeilage beachten. **Filmtbl.:** Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten. (Stand August 2019). **Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlin.**