

**Perenterol® 50 mg Kapseln / Perenterol® forte 250 mg Kapseln / Perenterol® Junior 250 mg Pulver.**  
**Wirkstoff:** Trockenhefe aus *Saccharomyces cerevisiae* HANSEN CBS 5926 (Synonym: *Saccharomyces boulardii*). **Zus.:** 1 Hartkapsel / 1 Beutel enthält: 50 mg / 250 mg / 250 mg Trockenhefe aus *Saccharomyces cerevisiae* Hansen CBS 5926, min.  $1,8 \times 10^{10}$  lebensfäh. Zellen/g Lyophilisat. Sonst. Bestandt. (Perenterol® 50 mg Kapseln<sup>1</sup>, -forte 250 mg Kapseln<sup>2</sup>, -Junior 250 mg Pulver<sup>3</sup>): Lactose-Monohydrat<sup>1-3</sup>, Magnesiumstearat (Ph.Eur.)<sup>1,2</sup>, Sucrose<sup>1</sup>, Gelatine<sup>1,2</sup>, Natriumdodecylsulfat<sup>1,2</sup>, Farbstoff: Titandioxid (E171)<sup>1,2</sup>, Fructose (Ph.Eur.)<sup>3</sup>, hochdisperses Siliciumdioxid<sup>3</sup>, Tutti-Frutti-Aroma (Pulver, künstlich)<sup>3</sup>. **Anwend.:** Zur symptom. Behandlung akuter Diarrhöen. Zur Vorbeugung und symptom. Behandlung v. Reisediarrhöen sowie Diarrhöen unter Sondenernährung. Zur begleitenden Behandlung (als Adjuvans) b. chron. Formen d. Akne. **Gegenanz.:** Bek. Überempfindl. gg. Inhaltsst., Hefeallergie, insb. gg. *Saccharomyces boulardii*; Pat. m. ZVK; schwerkranke od. immunsuppr. Patienten aufgr. d. Fungämierisikos. Säuglinge und Kleinkinder unter 2 J. sind in jedem Fall v. einer Selbstmedikation auszuschließen u. nur nach Rückspr. mit d. Arzt zu behandeln. Schwangerschaft u. Stillzeit: Keine Anwendung. Hinweis: enthält Lactose. Pat. m. selt. hereditärer Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel od. Glucose-Galactose-Malabsorption sollten Perenterol® nicht einnehmen. Perenterol® 50 mg zusätzl.: enth. Sucrose. Pat. m. selt. hereditärer Fructose-Intoleranz od. Saccharase-Isomaltase-Mangel sollten Perenterol® 50 mg nicht einnehmen. Perenterol® Junior 250 mg zusätzl.: enth. Fructose. Pat. m. selt. hereditärer Fructose-Intoleranz sollten Perenterol® Junior 250 mg nicht einnehmen. **Nebenw.:** Sehr selten: Fungämie b. Pat. mit ZVK u. b. schwerkrank. od. immunsuppr. Pat. Häufigkeit nicht bekannt: Überempfindl.reakt. in Form v. Juckreiz, Urtikaria, lokal. od. generalisier. Exanthem, Quincke-Ödem, Atemnot u. anaphylaktischer Schock, Blähungen. **Weit. Angaben** s. Gebrauchs- u. Fachinformation. Stand: Dezember 2017. MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn.